

# 風疹抗体検査、予防接種について

## (3月より) 福岡市では

●風疹の 抗体検査 と 予防接種 を行います。

対象者：福岡市民で、

- ① 妊娠希望者
- ② 妊娠希望者 および 妊婦の
  - A.配偶者（パートナーを含む）
  - B.同居者（生活空間を同一にする頻度が高い家族など。）

## (4月より) 国の事業では

●風疹の 抗体検査 と 予防接種 を行います。

対象者：昭和37年～昭和57年生まれの男性（1962～1979年）

（現在39歳～56歳）

# I. 福岡市 風しん 抗体検査

- ・現在、各区保健福祉センター（月2回）で実施している風疹抗体検査事業を、医療機関で開始します。
- ・開始時期  
2019年3月～  
（区保健福祉センターでの実施は2019年3月末で終了）
- ・受検者費用負担  
無料（全額補助）

## II. 福岡市 風疹 予防接種の助成

- 風疹 任意予防接種の費用を助成
- 実施期間  
2年間（2019年3月～2021年3月31日まで）
- 受診者費用  
3000円（医療機関で支払い、MRワクチンの場合）  
ただし、1人につき1回限り

### III. 風疹 の第5期定期予防接種(国が実施)

- 対象: 抗体保有率が低い  
昭和 37年4月2日～昭和 54年4月1日生まれの  
男性で、抗体検査で抗体価が低い人。
- 期間: 3年間(2019年4月1日～2022年3月31日まで)
- 費用: 無料
- クーポン券と受診表(抗体検査時)、または予診票(予防接種時)  
を用いる。

# 風疹 抗体検査結果 確認書類

対象者	抗体検査結果確認書類の種類
<p>1. <b>妊娠希望者</b> (妊婦は除く)</p> <p>要件：自身の風疹抗体検査の結果 抗体が十分でない場合</p>	<p>下記書類のいずれか。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>① 風疹抗体検査の結果書の写し</li><li>② 第2子以降の妊娠希望者は、母子健康手帳の「風疹抗体検査結果」が記載された頁の写し</li></ul>
<p>2. 妊娠希望者 及び 妊婦の</p> <p>A. <b>配偶者</b> (パートナーを含む)</p> <p>B. <b>同居者</b> (生活空間を同一にする 頻度が高い家族など。)</p> <p>要件：<b>自身</b>の風疹抗体検査の結果 抗体が十分でない場合 (妊娠希望者 及び 妊婦が、<b>抗体価が低い</b> 又は <b>風疹抗体検査 未実施</b>の場合に限る。)</p>	<p>上記書類①か②のいずれかに加えて</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) 配偶者 (パートナーを含む) または 同居人本人の 風疹抗体検査の結果書の写し (HI,EIA法いずれか)</li></ul> <p>※ 風疹抗体検査 未実施の場合は口頭で確認。確認書類 は必要としない。</p>

実施者	福岡市	
	福岡市風疹 抗体検査	風疹 予防接種の助成
内容	抗体検査	予防接種
対象者	福岡市民で 1)妊娠希望者 2)妊娠希望者および妊婦の配偶者、パートナー、同居者	
	※ 対象外については、後述	
自己負担	0 円	3000 円
実施機関	福岡市医師会 委託医療機関	
接種基準		HI法(16倍以下) EIA法 (8.0未満)
過去の 検査結果		利用可能 (期間の指定なし)
請求	福岡市医師会	
実施期間	2019年3月~	2019年3月~ 2021年3月末

国		
	風疹第5期 定期予防接種	
	抗体検査	定期予防接種
昭和37年4月2日~昭和54年4月1日 生まれの男性		
※ 対象外については、後述		
0 円 (クーポン券)		
居住する地区以外の医療機関でも可能		
HI法(8倍以下) EIA法 (6.0未満)		
H26年4月以降の 検査分は利用可		
国保連合会		
2019年4月~2022年3月末		


# 風疹 (Rubella) について

1. 症状： ① 発疹 ② リンパ節腫脹(後頸部) ③ 発熱 (2~3日)
2. 典型的な風疹の皮疹 (顔面頸部から体幹に急速に広がり、癒合しない淡い皮疹)  
「癒合せず、色素沈着を残さない」というのは 小児の風疹で 成人では必ずしも当てはまらない。



3. 確定診断はPCRまたは風疹IgMで。 (疑い事例は保健所に連絡を)

# 風疹の経過



# 先天性風疹症候群について



先天性風疹症候群(CRS)  
Congenital Rubella Syndrome



- ① 難聴 (90%)
- ② 眼 (45-50%)  
白内障  
緑内障
- ③ 心臓  
先天性心疾患

1. 妊娠20週以内の妊娠初期から中期にかけて妊婦さんが感染すると、胎児の難聴、白内障、心臓病など生まれ持った、様々な障害を引き起こすことがあります。これを風疹症候群 (CRS)といいます。

2. 特に 妊娠4-6週での感染は CRS 発症率50%といわれます。



## Rubella in Japan

### Travelers' Health

#### Key Points

- There is an outbreak of rubella in Japan.
- Travelers to Japan should make sure they are vaccinated against rubella with the MMR (measles, mumps, and rubella) vaccine before travel.
- Rubella is very dangerous for a pregnant woman and her developing baby. Pregnant women who are not protected against rubella through either vaccination or previous rubella infection should not travel to Japan during this outbreak.